

# ИНСТРУКЦИЯ

## по медицинскому применению препарата

### ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ

**Регистрационный номер:** Р № 003976/01

**Торговое название:** Этиловый спирт

**Международное непатентованное или группировочное название:** этанол

**Лекарственная форма:** раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм.

<b>Состав:</b>	40 %	70 %	90 %
Этанол 95 %	- 360 г	- 675 г	- 927 г
Воды очищенной	- 640 г	- 325 г	- 73 г

**Описание:** прозрачная бесцветная подвижная летучая жидкость с характерным спиртовым запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** антисептическое средство.  
Код АТХ [D08AX08]

**Фармакологическое действие:** Противомикробное средство, при местном применении оказывает антисептическое действие (денатурирует белки микроорганизмов). Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Антисептическая активность повышается с увеличением концентрации этанола. Для обеззараживания кожи используют 70 % раствор, проникающий в более глубокие слои эпидермиса лучше, чем 90 %, обладающий дубящим действием на кожу и слизистые оболочки.

Является растворителем для ряда лекарственных средств (ЛС), а также экстрагентом для ряда веществ, содержащихся в лекарственном растительном сырье.

**Фармакокинетика:** При наружном применении всасывается с поверхности кожи и слизистых оболочек в системный кровоток. В метаболизме препарата участвует изофермент CYP2E1, индуктором которого он является.

**Показания к применению:** Лечение начальных стадий заболеваний: фурункул, панариций, мастит; обработка рук хирурга (способы Фюрбрингера, Альфреда), операционного поля (в т.ч. у лиц с повышенной чувствительностью к др. антисептикам, у детей и при операциях на областях с тонкой кожей у взрослых - шея, лицо). Консервация биологического материала, изготовление лекарственных форм для наружного применения, настоек, экстрактов.

**Противопоказания:** Гиперчувствительность.

**С осторожностью:** Беременность, период лактации, детский возраст.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания: При беременности применять препарат «по жизненным показаниям». При необходимости назначения препарата в период кормления грудью следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания на период лечения.

**Способ применения и дозы:** Наружно, в виде примочек. Для обработки операционного поля и предоперационной дезинфекции рук хирурга используют 70% раствор, для компрессов и обтираний (во избежание ожога) рекомендуется использовать 40% раствор.

90% раствор должен быть разведен до необходимых концентраций и использован по показаниям.

Лекарственные средства (ЛС), приготовленные на основе этанола, применяют в соответствии с инструкциями по медицинскому применению данных лекарственных форм.

**Побочное действие:** Аллергические реакции, ожоги кожи, гиперемия и болезненность кожи в месте наложения компресса. При наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки и может оказывать резорбтивное общетоксическое действие (угнетение центральной нервной системы).

**Особые указания:** Этанол при наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки, что нужно учитывать при его использовании у детей, беременных женщин и в период лактации, при управлении транспортными средствами и занятии др. потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Форма выпуска:** Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 40 %, 70%, 90 %. По 50 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми пластмассовыми или колпачками алюминиевыми, или по 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные колпачками алюминиевыми или колпачками с перфорацией. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. По 1 л в бутылки или 3 л, 5 л, 10 л, 20 л, 30 л в канистры из полимерных материалов (для стационаров).

**Срок годности:** 3 года. Не использовать позже даты, указанной на упаковке.

**Условия хранения:** При температуре не выше 25 °С, в хорошо укупоренной таре, вдали от огня. В недоступном для детей месте.

**Условия отпуска из аптек:** По рецепту.

**Производитель:** ООО «РОСБИО»

192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, 12, Лит. «А». Тел./факс (812)412-12-71  
301150, Тульская обл., село Воскресенское, ул. Заводская, д. 1-а

**Производитель/организация принимающая претензии:**

192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, 12, Лит. «А». Тел./факс (812)412-12-71