

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ**

**Регистрационный номер:** P N000734/01

**Торговое наименование препарата**

Хлоргексидина биглюконат

**Международное непатентованное наименование или группировочное наименование**

Хлоргексидин

**Лекарственная форма:** раствор для наружного применения

**Состав**

Действующее вещество:

Хлоргексидин, субстанция-раствор 20 % - 2,5 мл

[эквивалентно 0,5 г хлоргексидина биглюконата]

Вспомогательное вещество:

Вода очищенная - до 1000 мл

**Описание**

Бесцветная прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость без запаха.

**Фармакотерапевтическая группа:** антисептическое средство.

**Код АТХ** D08AC02

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Антисептическое средство, проявляет бактерицидное действие (в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий) – при температуре 22<sup>0</sup>С и воздействии в течение 1 мин; фунгицидное действие при температуре 22<sup>0</sup>С и воздействии в течение 10 мин; вирулицидное действие (в отношении липофильных вирусов). Эффективен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (*Treponema spp.*, *Neisseria gonorrhoeae.*, *Ureaplasma spp.*, *Bacteroides fragilis.*, *Chlamydia spp.*); простейших (*Trichomonas vaginalis*); вирусов и грибов. На споры бактерий действуют только при повышенной температуре. Стабилен, после обработки кожи сохраняется на ней в некотором количестве, достаточном для проявления бактерицидного эффекта. Сохраняет активность (хотя несколько сниженную) в присутствии крови, гноя, различных секретов и органических веществ.

**Фармакокинетика**

Препарат не адсорбируется в системный кровоток при наружном применении и не оказывает системного действия. Практически не всасывается из желудочно-кишечного тракта.

**Показания к применению**

В качестве лечебно-профилактического средства при различных инфекциях, для антисептической обработки и дезинфекции. Профилактика инфекций, передаваемых половым путем (хламидиоз, уреаплазмоз, трихомониаз, гонорея, сифилис, генитальный герпес – применение не позднее 2 ч после полового акта); обеззараживание кожных покровов (потертости, трещины). Гнойные раны, инфицированные ожоги, бактериальные и грибковые

заболевания кожи и слизистых оболочек в хирургии, урологии, акушерстве и гинекологии, стоматологии (гингивит, стоматит, афты, пародонтит, альвеолит).

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность, дерматиты, аллергические реакции.

### **С осторожностью**

Детский возраст, беременность, период грудного вскармливания.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

При беременности и в период грудного вскармливания применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Перед применением препарата, если Вы беременны, или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, в период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Способ применения и дозы**

Наружно 5 - 10 мл раствора наносят на пораженную поверхность кожи или слизистых оболочек мочеполовых органов, ротовой полости на 1 -3 мин 2-3 раза в сутки (на тампоне или путем орошения).

Для профилактики заболеваний, передающихся половым путем, содержимое флакона с помощью насадки ввести в мочеиспускательный канал мужчинам (2-3 мл), женщинам (1-2 мл) и во влагалище (5-10 мл) на 2-3 мин. После процедуры рекомендуется не мочиться в течение 2 ч. Обработать кожу внутренних поверхностей бедер, лобка, половых органов.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

### **Особые указания**

В случае попадания на слизистые оболочки глаза, их следует быстро и тщательно промыть водой.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами механизмами**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

### **Побочное действие**

Тяжелые аллергические реакции, включая анафилаксию, сухость и зуд кожи, фотосенсибилизация. При лечении заболеваний полости рта – окрашивание эмали зубов, отложение зубного камня, нарушение вкуса.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка**

При наружном применении передозировка неизвестна.

### **Взаимодействие с другими препаратами**

Фармацевтически несовместим с мылом, щелочами и другими анионными соединениями.

Этанол усиливает эффективность препарата.

Не рекомендуется одновременное применение с йодом.

Если вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе

безрецептурные) перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

**Форма выпуска**

0,05 % раствор для наружного применения по 100 мл во флакон из стекла; по 100 мл во флакон полимерный или флакон из полиэтилентерефталата.

Для стационаров: по 20, 30, 50 флаконов по 100 мл с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в ящик или коробку из картона; по 0,5 л, 1 л в бутылку из полимерных материалов непрозрачного цвета; по 3 л, 5 л, 10 л, 20 л в канистру из полимерных материалов непрозрачного цвета.

**Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С.

В недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Отпуск без рецепта.

**Производитель:**

ООО «РОСБИО», Россия

192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 12, литер А.

Тел./факс (812) 412-12-71

301150, Тульская обл., Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Заводская, д. 1а

**Организация, принимающая претензии:**

ООО «РОСБИО», Россия

192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 12, литер А.

Тел./факс: (812) 412-12-71

Представитель фирмы:

Исполнительный директор

ООО «РОСБИО»

А.Н. Непушкин