

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

### **Хлоргексидина биглюконат 0,05 %**

наименование лекарственного препарата

**Международное непатентованное название:** хлоргексидин

**Лекарственная форма:** раствор для наружного применения

#### **Состав**

Действующее вещество:

Хлоргексидин раствор для приготовления лекарственных форм 20 % - 2,5 мл

[эквивалентно 0,5 г хлоргексидина биглюконата]

(ООО «РОСБИО», Россия)

Вспомогательное вещество:

Вода очищенная - до 1000 мл

#### **Описание**

Бесцветная прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость без запаха.

**Фармакотерапевтическая группа:** антисептическое средство.

**Код АТХ** [D08AC02]

#### **Показания к применению**

Профилактика инфекций (не позднее 2 ч после полового акта), передаваемых половым путем (хламидиоз, уреаплазмоз, трихомониаз, гонорея, сифилис, генитальный герпес).

Обеззараживание кожных покровов: гнойные раны, потертости, трещины, инфицированные ожоги, бактериальные и грибковые заболевания кожи и слизистых оболочек мочеполовых органов, гингивит, стоматит, афты, парадонтит, альвеолит.

#### **Противопоказания**

Гиперчувствительность, дерматиты, аллергические реакции.

#### **С осторожностью**

Детский возраст, беременность, период лактации.

#### **Применение при беременности и лактации**

При беременности и в период лактации применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

#### **Способ применения и дозы**

Наружно 5 - 10 мл раствора наносят на пораженную поверхность кожи или слизистых оболочек мочеполовых органов, ротовой полости на 1 -3 мин 2-3 раза в сутки (на тампоне или путем орошения).

Для профилактики заболеваний, передающихся половым путем, содержимое флакона с помощью насадки ввести в мочеиспускательный канал мужчинам (2-3 мл), женщинам (1-2 мл) и во влагалище (5-10 мл) на 2-3 мин. После процедуры рекомендуется не мочиться в течение 2 ч. Обработать кожу внутренних поверхностей бедер, лобка, половых органов.

**Особые указания**

В случае попадания на слизистые оболочки глаза, их следует быстро и тщательно промыть водой.

**Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами**

Применение препарата согласно инструкции по медицинскому применению не оказывает отрицательного влияния на выполнение опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций.

**Побочное действие**

Аллергические реакции, сухость и зуд кожи, фотосенсибилизация, окрашивание зубной эмали, отложение зубного камня, нарушение вкуса.

**Передозировка**

При наружном применении передозировка неизвестна.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Фармацевтически несовместим с мылом, щелочами и другими анионными соединениями.

Этанол усиливает эффективность препарата.

Не рекомендуется одновременное применение с йодом.

**Форма выпуска**

0,05 % раствор для наружного применения по 100 мл во флакон из стекла; 100 мл во флакон из полиэтилентерефталата. Для стационаров: По 0,5 л, 1 л в бутылку из полимерных материалов непрозрачного цвета. По 3 л, 5 л, 10 л, 20 л в канистру из полимерных материалов непрозрачного цвета.

**Условия хранения**

В защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре от 2 до 25 °С.

**Срок годности**

2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.