

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

КАЛЕНДУЛЫ НАСТОЙКА

Регистрационный номер: P N001085/01

Торговое наименование:

Календулы настойка

Международное непатентованное, или группировочное наименование, или химическое наименование: Календулы лекарственной цветков настойка

Лекарственная форма:

Настойка

Состав

Для приготовления настойки необходимо:

Активного компонента:

Ноготков лекарственных цветки

Вспомогательного вещества: - 100 г

Этанола (спирта этилового) 70 % - достаточное количество для получения 1 л настойки

Примечание:

Для приготовления этанола (спирта этилового) 70 % необходимо:

Медицинского антисептического раствора, субстанции-раствора 95 % - 675 г

Воды очищенной - 325 г

Описание

Прозрачная жидкость от желто-оранжевого до светло-коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептическое и противовоспалительное средство растительного происхождения.

Фармакологические свойства

Настойка календулы оказывает антисептическое, желчегонное, спазмолитическое и местное противовоспалительное действие.

Показания к применению

Применяют наружно как антисептическое и противовоспалительное средство при порезах, ушибах, экземах; местно - для полоскания горла при воспалительных заболеваниях глотки (тонзиллит, фарингит, ларингит) и слизистой оболочки полости рта (стоматит, гингивит, пародонтит). Внутрь настойку календулы применяют при холецистите, холангите.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

При применении внутрь – острый гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, калькулезный холецистит, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата внутрь при беременности и в период грудного вскармливания. Возможно наружное и местное применение препарата с учетом ожидаемой пользы для матери и возможного риска для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Наружно, местно, внутрь. Участки с поверхностными повреждениями кожных покровов (порезы) обрабатывают настойкой с помощью тампона. При ушибах и экземе применяют водный раствор настойки (1 чайную ложку на стакан воды) в виде примочек. Для полоскания горла и слизистой оболочки полости рта используют $\frac{1}{2}$ - 1 стакан водного раствора настойки. Курс лечения 1-2 недели.

Внутрь за 15 минут до еды применяют по 10-20 капель, разведенных в $\frac{1}{4}$ стакана воды 3 раза в день. Курс лечения 3-4 недели.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (в том числе кожный зуд). При приеме внутрь – изжога, тошнота, горечь во рту, боль в животе.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата составляет 0,23 г, в максимальной суточной дозе – 0,7 г.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения (при приеме внутрь) необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Настойка по 25 мл во флакон из стекла, укупоренный пробкой полиэтиленовой и навинчиваемой пластмассовой крышкой или колпачком алюминиевым.

Для стационаров: по 0,9 кг в бутылку из полимерных материалов непрозрачного цвета.

Для стационаров: по 4,5 кг, 9,0 кг, 18,0 кг в канистру из полимерных материалов непрозрачного цвета.

На флакон, бутылку, канистру наклеивают самоклеящуюся этикетку.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению вкладывают в пачку из картона для потребительской тары. Флаконы в пачках, бутылки помещают в ящик из гофрированного картона или коробку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.